

PATIENTEN MERKBLATT FÜR AMBULANTE COLOSKOPIE

Abteilung für Innere Medizin - Abteilung für Allgemeinchirurgie

VORBEREITUNG

Eine Woche vor der Untersuchung:

- >> Keine Ballaststoffe (Vollkornprodukte)
- >> Kein kernhaltiges Obst (Kiwi, Äpfel, u. s. w.)
- >> Kein Mohn
- >> Keine Eisenpräparate

Falls der Patient eine orale Antikoagulation einnimmt („Blutverdünnung“ mit Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana, Marcoumar oder Sintrom), oder Thrombozytenaggregationshemmer (Plavix, Clopidogrel, Brilique) sollte diese pausiert werden. Bitte immer in Rücksprache mit dem Hausarzt bzw. Internisten durchführen. Aspirin (Thrombo-ASS u. ä.) kann weiter eingenommen werden. Bei Patienten mit Niereninsuffizienz Stadium G4 oder höher (d. h. eGFR<30mg/l) bitte stationäre Aufnahme zur Vorbereitung.

Einen Tag vor der Untersuchung:

Morgens: leichtes Frühstück
Mittags: klare Suppe + leichtes Mittagessen
17.00 Uhr: 1 Beutel Moviprep Sachet A+B mit 1 Liter Wasser verdünnen und innerhalb 1 Stunde trinken, zusätzlich mind. 500 ml klare Flüssigkeit

Am Untersuchungstag:

Ab 5.00 Uhr gleiches Vorgehen wie um 17.00 Uhr des Vortages. Stuhl muss „kamillenteartig“ aussehen. 1 Stunde vor der Untersuchung keine Flüssigkeitszufuhr mehr.

ACHTUNG!

Unsere ENDOSKOPIE ist umgezogen auf Ebene 2.

Eintritt beim Haupteingang, mit den Aufzügen gleich links in den 2. Stock, dann Ausgang nach links nehmen, am Ende des Glasganges rechts befindet sich die Endoskopie-Ambulanz!

UNTERSUCHUNGSZEITEN:

08.00 bis 12.00 Uhr (je nach Termin)

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an das Endoskopie-Team:

Tauernklinikum Zell am See: 06542 777 DW: 2220 – Email: tkz.endoskopie@tauernklinikum.at
Tauernklinikum Mittersill: 06562 4536 DW: 129 – Email: andrea.huber@tauernklinikum.at

>> Nach der Untersuchung ist infolge der Medikamentengabe das Lenken eines Kraftfahrzeuges nicht erlaubt!

OA Dr. Raffaele Eigner
Interim. Leitung Abt. für Allgemeinchirurgie

Prim. Univ.- Doz. Dr. R. R. Wenzel
Vorstand d. Abteilung für Innere Medizin