

OP ANMELDEFORMULAR

ABTEILUNG UROLOGIE

Vor-/Nachname Patient:in																													
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td>T</td><td></td><td>M</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>J</td><td></td> </tr> </table>												T		M					J		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>								
	T		M					J																					
Geburtsdatum	Versicherungsnr.																												
Telefonnummer Patient:in																													
Zuweiser																													

► **Diagnose:**

.....

► **Gewünschte Operation:**

.....

Wunschtermin (ungefährer Zeitraum)/
kann der Patient/die Patientin bei Bedarf vorgezogen werden:

Relevante Nebendiagnosen:

.....

.....

Abdominelle bzw. relevante Voroperationen:

.....

.....

Antikoagulation:

Bei Prostatakarzinom Gleason Score u. PSA:

PIN CODE für MRT/ CT:

BMI bei Adipositas:

Zusätzliche Informationen:

z.H. OA Dr. Hannes Segl, F.E.B.U. - Stv. Abteilungsleiter Urologie Tauernklinikum

TAUERNKLINIKEN GmbH

Standort Zell am See
Paracelsusstraße 8
A-5700 Zell am See

Abteilung für Urologie

Vorstand: Prim. Priv.-Doz.
Dr. Stephan Hruby, FEBU
t +43 (0)5 0272-23800
DaMe bzw. Medicalnet: MEKHZELL
urologie@tauernklinikum.at

Für einen Eingriff mit dem DaVinci System oder Großeingriffe nötig:

- ▶ Voruntersuchung beim Hausarzt, ab ASA III oder höher ist eine Internistische OP Freigabe nötig
- ▶ Originalhistologie im Anhang, wenn nicht bereits im Tauernklinikum vorliegend
- ▶ Präoperatives Staging je nach Zuweisungsdiagnose nach EAU Empfehlung
- ▶ Bei erhöhtem BMI über 33, ausgeprägten abdominalen Voroperationen oder Comorbiditäten bitten wir um präoperative Kontaktaufnahme zur gemeinsamen Evaluierung der Operationsindikation bzw. Durchführbarkeit
- ▶ Bei blutverdünnenden Medikamenten werden die ÖGARI-Leitlinien empfohlen: (Eliquis, Lixiana und Xarelto 48 Stunden und Pradaxa GFR-abhängig zwischen 2-4 Tage, präoperativ ohne Briding pausieren. Marcoumar und Sintrom 7-10 Tage präoperative Umstellung auf niedermolekulares Heparin. Clopidogrel 7 Tage, Thrombo-ASS 5 Tage und Brilique sollte präoperativ mind. 3 Tage pausiert werden)